

I, K 7 Pars intestinorum ab *I* ad *K* protensa, uulgate nomine nunc duodenum intestinum, nunc intestinum duodenum digitorum longitudine, mihi uocatur.

L 7 Ieiuni intestini initium, graciliumque intestinorum sedes, ubi primum in anfractus conuolui atque antrosum assurgere incipiunt.

M 7, 8 Ilei intestini terminus, & gracilium intestinorum finis. uerum quamnam sede ieiuni intestini terminus, aut ilei intestini principium sit ponendum, augurari nequeo, quum toto ductu qui ab *L* in septima figura in eadem & octaua ad *M* usque pertinet, nullibi discrimen commonstret, quo ieiunium ab ileo liceret distinguere.

N Extuberans crassorum intestinorum initium.

O Hoc intestinum mihi caecum nuncupatur, non admodum contententi an quis eo nomine aliam crassorum intestinorum partem donari uelit: modo is non adeo nominum sit studiosus, ut illorum occasione ea in intestinorum fabrica spectare negligat, quae in partium aliarum constructione sedulo inquirimus.

N, P, Q *R, S, T*, 6, 8 Colum intestinum his characteribus insignitur, uerum singuli priuatim aliquid notant. *N* enim ad *P* usque coli intestini ductum notat, a dextri renis sede ad iecoris usque cauum pertinentem. *A* Puero ad *Q* coli ductus notatur, secundum uentriculi fundum a iecoris cauo ad lienis usque regionem protensus. *A* *Q* autem ad *R* ductus coli insinuat, a lienis regione ad pubis os, secundum sinistram ile procedens. Caterum ab *R* ad *S* (quod in *s* priuatim uisitur) coli indicatur ascensus anfractusque, quem sursum ad umbilici usque regionem molitur. At *S* ad *T* usque progressum notat, ducti nunc ascensus ad recti intestini initium.

V, V 6, 8 Depressa coli intestini sedes.

X, X 6, 8 Coli intestini utrinque extuberantes semiglobuli, quos cellulas uulgo uocat.

Y 6, 8 Recti intestini initium. Quicquid uero sub *Y* consistit, rectum est intestinum.

Z 7 Portio meatus bilem in intestina perferentis.

a 8 Musculus recti intestini finem orbiculatim amplectens, faeciumque excretioni praefectus.

b, c 8 Duo musculi rectum intestinum post faecium excretionem sursum alacriter contrahentes.

d, s 8 Hac sede rectum intestinum uirorum peni & mulierum uteri cervici interuentu musculo se substantiae conuiscitur.

e, f 6 Duae arteriae foetui peculiares.

g 6 Hoc caractere uescicae fundus indicatur, uti & meatus quo foetus urina expellitur, quemque hic ut & nuper commemoratas arterias ab truncatum finimus.

NONA QVINTI LIBRI FIGVRA, CUIVS
VTI ET EIVSDEM CHARACTERVM INDICEM
hic lateri adhibuimus.

H *A* *C* figura recti intestini & coli quoque quae id recto continuatur, partem expressimus, intestinorum tunicas commonstraturam.

b Prima intestinorum tunica, quae & intima est, ac solis transversis circularibusue confirmatur fibris.

i, i Secunda intestinorum tunica, quae transversis quoque efformatur fibris, attamen rectis quoque donatur pluribus, quo recto intestino uicinior est.

k, k Mesenterij est portio, quae rectum intestinum ossi sacro committit, ac tertiam ipsi exporrigit tunicam.

L, L Tertia intestinorum tunica, a mesenterij pronata membranis.



DECL



DECIMAE FIGVRAE EIVSDEM
racterum Index

V *T* praesens figura mesenterij situm quam appositissimè decumque ad latera sursum deorsumque inuicem manibus demonstrat centrum, et rationem qua mesenterium intestinis alligat. Ad haec, eius quoque mesenterij partem ostendit dorso alligat. Succedit uero haec figura sectionis serie.

A, B, C, D Portiones peritonaei, aperto iam abdomine in.

E, E, E Tenuia intestina.

F Caecum intestinum.

G, G, G Colon intestinum.

H Recti intestini initium.

I Vescica, cui peritonaeum ea potissimum sede conuiscitur.

K Mesenterij centrum, eaque dorso pars quae id a peritonaeo arteriam & cauum uenam hic uertebrae corporibus.

L, L Corpus glandulosum, mox in ipsa uasorum distribuitur.